



Configurations types des géonattes coco pré-végétalisées

Longueur de 5 m et largeur standard de 1 m, (possibilité de largeur de 0.75 et 0.50 m) pour aménagements et protections de berges. Nous vous proposons aussi des fascines d'hélophytes, boudins de coco végétalisés d'une longueur de 3 m et d'un diamètre de 0,3 m.



Configuration type 8



Configuration type 11

Nota : les noms des villes associées aux configurations n'ont rien à voir avec la zone d'implantation de celles-ci. Ces noms sont donnés à titre purement commercial.

Schéma 1 - Amsterdam :

Caractéristiques : Très bonne résistance à l'herbivorie et au piétinement par les canards.

Laïche aiguë <i>Carex gracilis</i> 10%		Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 5%		Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 15%		Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsiflora</i> 5%		Laïche des marais <i>Carex acutiformis</i> 15%	
Acore odorant <i>Acorus calamus</i> 20%				Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 30%					

Schéma 2 - Barcelone :

Caractéristiques : Espèces tolérantes à l'ombre.

Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 20%		Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 10%		Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsoflora</i> 5%		Laîche des rives <i>Carex riparia</i> 10%		
Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 5%		Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 7%		Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i> 5%		Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 30%		

Schéma 3 - Cologne :

Caractéristiques : Espèces adaptées à de fortes contraintes hydrauliques.

Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 10% 	Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsisiflora</i> 5% 	Jonc des tonneliers <i>Scirpus lacustris</i> 35% 	
Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 15% 	Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 10% 	Laîche des rives <i>Carex riparia</i> 15% 	Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 10% 

Schéma 4 - Dublin :

Caractéristiques : Espèces majoritairement florales.

Populage des marais <i>Caltha palustris</i> 5% 	Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 10% 	Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 15% 	Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 20% 	Eupatoire chanvrine <i>Eupatorium cannabinum</i> 5% 
Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 25% 	Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsiflora</i> 5% 	Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 20% 		

Schéma 5 - Eidenhoven :

Caractéristiques : Espèces adaptées aux faibles vitesses de courant.

Menthe aquatique <i>Mentha aquatica</i> 5% 	Bucabunga <i>Veronica bucabunga</i> 5% 	Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsiflora</i> 5% 	Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 10% 	Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 25% 
Glycérie aquatique <i>Glyceria maxima</i> 25% 	Rubaniér ramifié <i>Sparganium erectum</i> 15% 	Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 10% 		

Schéma 6 - Florence :

Caractéristiques : Espèces adaptées à des vitesses de courant modérées.

Baldingère faux-roseau <i>Phalaris arundinacea</i> 35% 	Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 5% 	Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 15% 
Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 20% 	Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i> 5% 	Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 20% 

Schéma 7 - Gênes :

Caractéristiques : Espèces tolérantes à l'ombre.

Scirpe des bois <i>Scirpus sylvaticus</i> 20% 	Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i> 5% 	Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 15% 	Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 5% 
Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 30% 	Baldingère faux-roseau <i>Phalaris arundinacea</i> 10% 	Laîche des rives <i>Carex riparia</i> 15% 	

Schéma 8 - Hambourg :

Caractéristiques : Espèces majoritairement florales.

Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 35%		Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i> 5%		Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 10%	
Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 25%		Populage des marais <i>Caltha palustris</i> 5%		Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsoiflora</i> 5%	
				Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 15%	

Schéma 9 - Imola :

Caractéristiques : Espèces adaptées à des vitesses de courant modérées.

Baldingère faux-roseau <i>Phalaris arundinacea</i> 20%		Laîche des marais <i>Carex acutiformis</i> 20%		Laîche des sables <i>Carex arenaria</i> 10%	
Iris des marais <i>Iris pseudacorus</i> 25%		Salicaire <i>Lythrum salicaria</i> 8%		Laîche aiguë <i>Carex gracilis</i> 10%	
				Reine des prés <i>Filipendula ulmaria</i> 7%	

Schéma 10 - Jersey :

Caractéristiques : Espèces adaptées à des vitesses de courant modérées.

	Roseau commun <i>Phragmites communis</i> 100%	
--	--	--

Schéma 11 - Kiev :

Caractéristiques : Espèces basses.

Populage des marais <i>Caltha palustris</i> 5% 	Lysimaque à fleurs en épi <i>Lysimachia tyrsiflora</i> 5% 	Menthe aquatique <i>Mentha aquatica</i> 10% 	Laiche jaune <i>Carex flava</i> 15% 	Myosotis des marais <i>Myosotis palustris</i> 5% 
Laïche noire <i>Carex nigra</i> 25% 	Plantain d'eau <i>Alisma plantago- aquatica</i> 10% 	Laïche des renards <i>Carex vulpina</i> 15% 		

AquaTerra Solutions - Concepteur, producteur et distributeur de solutions de contrôle de l'érosion

AquaTerra Solutions
Les Vincentes
26270 CLIOUSCLAT – France
Tél : +33(0)475 638 465
Fax : +33(0)475 638 468
www.aquaterra-solutions.fr



Membre d'European Soil & Water Engineering Group
Email: contact@esweg.eu
www.esweg.eu



Les pourcentages indiqués dans les configurations sont donnés à titre indicatif. D'autres espèces végétales peuvent être présentes en raison de la proximité des différentes configurations de fascines dans nos aqua-pépinières.